



## Risico minimalisatie materiaal

betreffende  
Tracydal® (tranylcypromine) voor  
patiënten

## Dieetadviezen

### Meer informatie?

Misschien heeft u na het lezen van deze folder nog vragen. Uw diëtist of behandelend arts zal ze graag beantwoorden. U kunt voor vragen ook bellen of mailen naar:

Tel: 024 3030804

Email: [pvd@dada.nl](mailto:pvd@dada.nl)

Uitgave: Daleco Pharma b.v.  
Januari 2018

## Introductie

De risico minimalisatie materialen voor Tracydal® (tranylcypromine) zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Het gebruik van Tracydal® (tranylcypromine) verhoogt het risico op hypertensieve crisis (ook wel kaasreactie genoemd).

- De patiënt dient zich aan een tyramine-arm dieet te houden (en de bloeddruk regelmatig te controleren), zoals vermeldt in deze dieetadviezen.

Naast de distributie van bijgevoegd educatief materiaal en de patiëntenpas is een registry studie opgestart. In deze registry studie wordt gekeken naar specifieke bijwerkingen van Tracydal® en naar de effectiviteit van de risico minimalisatie materialen.

Schrijft u een patiënt Tracydal® voor, dan zouden wij u willen vragen om deze patiënt aan te melden voor deze studie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon of email:

Tel: 024 3030804

Email: [pharmacovigilance@dada.nl](mailto:pharmacovigilance@dada.nl)

## MAO-remmer en tyramine

Uw arts heeft u Tracydal® (tranylcypromine); een MAO-remmer, voorgeschreven. Dit is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een ernstige depressie (multiresistente depressie waarbij een adequate behandeling met 2 standaard antidepressiva en een toegevoegde behandeling met bijvoorbeeld lithium onvoldoende werkzaam was).

Een MAO-remmer remt de werking van het enzym MonoAmine Oxidase (MAO). Dit is een enzym, dat een rol speelt bij de afbraak van neurotransmitters, zoals serotonine, dopamine en noradrenaline. Deze stoffen spelen een belangrijke rol bij depressie aangezien een tekort aan deze stoffen stemmingsstoornissen kan veroorzaken.

Door het enzym MAO te remmen vindt er minder afbraak plaats en dat leidt tot een verhoging van de concentratie van de neurotransmitters dopamine, serotonine en noradrenaline. Het enzym MAO zorgt echter ook voor de afbraak van tyramine, een eiwitachtige stof, in uw lichaam. Door het gebruiken van een MAO-remmer kan de hoeveelheid tyramine in uw bloed stijgen. Te veel tyramine in het bloed is niet goed, omdat de bloeddruk dan kan stijgen. Tyramine komt van nature voor in uw voeding en wordt onder invloed van bacteriën gevormd uit eiwitten in de voeding. Verse eiwitrijke producten bevatten weinig tyramine. Naarmate eiwitrijke producten langer bewaard worden, neemt de bacteriële omzetting toe en dus ook de hoeveelheid tyramine. De hoeveelheid tyramine neemt ook toe bij het bewerken (bijvoorbeeld drogen of roken) van voedingsmiddelen. Daarom is het belangrijk om vooral verse producten te gebruiken en goed te letten op hoe u ze bewaart.

Als u een MAO-remmer gebruikt moet u dus rekening houden met wat u eet en drinkt. Bij een te hoge concentratie tyramine kan zeer plotseling een erg hoge bloeddruk ontstaan, wat in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot orgaanschade of een hersenbloeding.

U kunt dit voorkomen door u strikt aan het verderop in dit boekje beschreven dieet te houden.

### Het dieet bij gebruik van een MAO-remmer

U begint met dit dieet op dezelfde dag dat u Tracydal® gaat slikken. De meeste voedingsmiddelen kunt u gewoon gebruiken. In dit boekje krijgt u uitleg over wat u wel en niet kunt eten.

**Het advies is om dagelijks per productgroep niet meer dan één product uit de 2e kolom te gebruiken.**

## Kaas

Hollandse kazen zijn gemaakt van gepasteuriseerde melk. Pasteuriseren wil zeggen: verhitten tot 72°C waardoor bacteriën worden gedood. Kaas gemaakt van ongepasteuriseerde melk bevat dus meer tyramine. Wanneer op de verpakking staat: "rauwmelkse kaas" of "lait cru" dan is de kaas gemaakt van ongepasteuriseerde melk. Aanbevolen wordt om kaas fabrieksmatig verpakt te kopen en te letten op de THT (datum ten minste houdbaar tot). Bewaar kaas (na openen) niet langer dan twee weken in de koelkast, ook al is de THT datum nog niet verlopen.

Jonge gesmolten kaas is toegestaan (bijvoorbeeld op een tosti of in een ovenschotel).

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
<b>Jonge kaas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jonge Edammer</li> <li>- Jonge Goudse</li> <li>- Jonge Leidse (komijn)</li> <li>- Jonge Maaslander</li> <li>- Jonge Leerdammer;</li> <li>- Maasdammer</li> </ul>	Max. 2 plakken = 40 gram van jong belegen, belegen en extra belegen Hollandse kaas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goudse</li> <li>- Edammer</li> <li>- Maasdammer, Leerdammer</li> <li>- Leidse kaas (komijn)</li> </ul>	<b>Smelt- en smeerkaas, rookkaas</b> <b>Boerenkaas</b>  <b>Oude overjarige Hollandse kaas</b> <b>Geitenkaas</b> <b>Schapenkaas</b>
<b>Zachte verpakte kazen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verse kaas of kwark</li> <li>- Hüttenkäse</li> <li>- Ricotta</li> <li>- Cottage cheese</li> <li>- Mozzarella</li> <li>- Feta gemaakt van koemelk</li> <li>- Mascarpone</li> </ul>	In plaats van 1 plak kaas kunt u max. 10 gram (1 eetlepel) nemen van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parmezaanse kaas, pesto op basis van Parmezaanse kaas</li> <li>- Zwitserse strooikaas.</li> </ul>	Ongepasteuriseerde kaas. <b>Buitenlandse kaas</b> , zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brie</li> <li>- Camembert</li> <li>- Emmenthaler</li> <li>- Cheddar</li> <li>- Gorgonzola, Roquefort en andere blauwschimmelkaas</li> <li>- Gruyère</li> <li>- Feta, gemaakt van schapen- en geitenmelk.</li> </ul>
<b>Cream cheese of roomkaas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mon Chou</li> <li>- Boursin</li> <li>- Paturain</li> <li>-</li> </ul>		<b>Kaasproducten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaaschips</li> <li>- Kaaszoutjes</li> <li>- Kaaskoekjes</li> <li>- Kaasburgers</li> <li>- Kaassoufflés</li> <li>- Kaassaus uit pakjes</li> </ul>

## Vlees, vleesvervangers, vis, kip en ei

Het eiwit in eiwitrijke producten zoals vlees, vleesvervanger, vleeswaren, kip en ei kan bij lang(er) bewaren door bacteriën worden omgezet in tyramine. Het is daarom belangrijk deze producten niet langer dan twee dagen in de koelkast te bewaren en deze te bereiden en te eten kort na aanschaf. Rauwe eiwitrijke producten zijn bij een temperatuur van >4°C snel aan bederf onderhevig.

Vlees en vis kunnen gestoomd en/gerookt worden. Dit gebeurt bij een temperatuur tussen de 30 en 60°C. Bij deze temperatuur kunnen bacteriën zich snel vermenigvuldigen waardoor het tyraminegehalte in het product toeneemt. Als er rook in de ingrediëntendeclaratie vermeld staat, wordt een product echt gerookt en is het niet toegestaan. Producten die worden bereid in een rookoven worden warm gerookt en zijn dus ook niet toegestaan. Producten die alleen rookaroma bevatten zijn wel toegestaan.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle soorten vlees, vis en kip en vleeswaren behalve de hiernaast genoemde</li> <li>- Alle soorten kip en gerookte kip</li> <li>- Ei</li> <li>- Biefstuk (medium of rose), tartaar bereid, gebraden rosbief</li> <li>- Kroepoek</li> <li>- Zure haring alleen uit pot gebruiken</li> <li>- Vis uit blik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saté gemarineerd in sojasaus/ ketjap</li> <li>- Salami (max 1 plak, 15 gram) <i>of</i></li> <li>- Cervelaatworst (max 1 plak, 15 gram) <i>of</i></li> <li>- Rookvlees, rauwe ham, bacon, rookspek (max 15 gram) <i>of</i></li> <li>- Belegsoorten die hierop lijken (max 1 plak, 15 gram) <i>of</i></li> <li>- 1 Portie paté van 15 gram</li> <li>- (Kippen)lever max 50 gram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rauw vlees (zoals carpaccio), rauwe vis (bijv. in sushi's), rauw ei en ongere kip</li> <li>- Vlees met kaas (bijv. cordon bleu, grillworst met kaas) en hamburgers met kaas</li> <li>- Gerookte kip</li> <li>- Zoutvlees</li> <li>- Gestoomde vis</li> <li>- Gerookte vis en/of op hout gerookte vis zoals makreel en zalm(moot)</li> <li>- Gedroogde vis, stokvis, bakkeljauw</li> <li>- Gravad Laks (gemarineerde zalm)</li> <li><i>Let op bovenstaande bij een visbuffet!</i></li> </ul>
<p><b>Uitsluitend in fabrieksverpakking:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filet americain</li> <li>- Ossenworst</li> <li>- Rookworst</li> <li>- Bloedworst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansjovis (15 gram)</li> <li>- 1 <b>verse</b> Hollandse nieuwe uit de viswinkel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rookworst die niet fabrieksmatig is bereid</li> <li>- Ambachtelijke rookworst</li> <li>- Hema rookworst</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeer koel bewaarde verse vis uit de viswinkel, gebakken, gestoofd of gegrild (bijv. zalm of tonijn)</li> </ul>		Trassi
<p><i>Vleesvervangers op basis van noten, granen, soja, ei en</i></p>		

*Quorn en Valess producten  
zonder kaas zijn toegestaan.*

## Sojaproducten en gefermenteerde sauzen

Fermenteren wil zeggen dat er veranderingen in een product plaatsvinden onder invloed van bacteriën, gisten of schimmels. Deze micro-organismen kunnen het eiwit uit de producten omzetten in tyramine, waardoor deze gefermenteerde producten niet onbeperkt gegeten kunnen worden. De wijze van fermenteren bepaalt hoeveel van onderstaande producten gebruikt kunnen worden. Wanneer u gaat eten in een Oosters restaurant, informeer dan naar het gebruik van ketjap en andere Oosterse sauzen.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahoe</li> <li>- Tofu</li> <li>- Heldere, gele en rode woksaus</li> </ul>	<p><b>Tempeh</b> (gefermenteerd sojaproduct), max 100 gram per dag, mits vers en verpakt!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Worcestershiresaus</li> <li>- Tamari</li> </ul>
Alle producten waarin soja is verwerkt.	<p><b>Sojasaus</b> (Ketjap) en producten die hierop lijken met mate ( 1 eetlepel per dag). Flesjes na openen max. 3 maanden in koelkast bewaren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overige gefermenteerde Oosterse (vis)sauzen, bruine woksauzen</li> </ul>
	<p><b>Satésaus</b> bereid met sojasaus/ ketjap</p>	

## Groenten en fruit

Verse groente en fruit bevat van nature nauwelijks tyramine. U mag alle soorten gebruiken behalve zuurkool.

Witte kool wordt onder invloed van bacteriën gedurende 6 weken omgezet in zuurkool. Door dit fermentatieproces kan zuurkool tyramine bevatten.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle soortengroenten en fruit</li> <li>- Peulvruchten zoals kidneybonen, bruine bonen, linzen, (kikker) erwten</li> <li>- Gedroogd fruit.</li> <li>- Ingemaakte groente zoals atjar tjampoer, augurken, zilverui e.d.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- (gepasteuriseerde) zuurkool</li> </ul>

## Dranken en (na overleg arts) alcoholische dranken

Er zijn theesoorten te koop met gezondheidsclaims, zoals: goed voor de bloeddruk, de stofwisseling, de stoelgang, om af te vallen, enz. Omdat onbekend is welke stoffen aan deze thee zijn toegevoegd, wordt geadviseerd deze niet te gebruiken. Zelfgemaakte advocaat (ook te koop in landwinkels) en tokkelroom zijn niet toegestaan omdat ze bestanddelen van rauwe eieren bevatten. Zware biersoorten bevatten meer gist. Gist bevat van nature veel tyramine. Mousserende wijnen zoals bijvoorbeeld champagne en prosecco zijn gemaakt met meer gist waardoor ze meer tyramine bevatten. Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag\*.

Wat u wel mag drinken	Wat u beperkt mag drinken	Wat u niet mag drinken
<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Soja) melk en karnemelk</li> <li>- (Vruchten)thee en kruidenthee als kamille, kaneel, pepermint. Rooibosthee en groene thee. Wintermelange e.d.</li> <li>- Water</li> <li>- Frisdranken</li> <li>- Sportdranken</li> <li>- Vruchtensappen</li> <li>- Koffie (met koffiemelk)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zoethoutthee (max. 0,5 l vanwege invloed op de bloeddruk (glycyrrhizinezuur))</li> <li>- Goede nachtrust thee (Zonnatura), max 1-2 kopjes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongepasteuriseerde melk</li> <li>- Overige kruidenthee, thee met St Janskruid of thee met gezondheidsclaim als goed voor bloeddruk, stofwisseling, stoelgang, etc.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alcoholvrij bier, alcoholvrij witbier en alcoholvrij rosébier (o.a. van Bavaria)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 glas wijn, port, sherry, advocaat <i>of</i></li> <li>- 1 glas sterke drank <i>of</i></li> <li>- 1 flesje bier of radler</li> <li>- mousserende wijnen met normale kurk of schroefdop (Frizzante)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zelfgemaakte advocaat en tokkelroom</li> <li>- Chiantiwijn</li> <li>- Champagne</li> <li>- mousserende wijnen met champagnekurk en ijzerdraadje (Spumante)</li> <li>- Witbier of zware bieren</li> <li>- Belgisch bier</li> <li>- Kloosterbier</li> <li>- Bier met extra gist</li> <li>- Tapbier</li> </ul>

\*) richtlijn Goede Voeding Gezondheidsraad 2015.

## Nagerechten

Alle zuivelproducten gemaakt van gepasteuriseerde melk bevatten, als ze vers zijn en goed gekoeld bewaard, geen tyramine. Zelfgemaakte tiramisu is een eiwitrijk product en wordt in tegenstelling tot fabrieksmatig gemaakte tiramisu in een niet gekoelde ruimte bereid.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
(Soja)vla, pudding, (soja) yoghurt, skyr yoghurt, biogarde, ijs, tiramisu (kant en klaar, verpakt), slagroom	Fabrieksmatig gemaakte kefir van koemelk; maximaal 150 ml	Zelfgemaakte tiramisu Zelfgemaakte kefir en kefir gemaakt van schapen of geitenmelk

## Gistproducten

Gist bevat van nature veel tyramine. Producten waar pure gist aan toegevoegd wordt, zijn daarom ook tyraminerijk. Gist in brood wordt omgezet en mag dus wel gebruikt worden. Reformproducten kunnen gist bevatten. Het is verstandig om de verpakking goed te lezen. Gistextract is een stof die de natuurlijke smaak van voedingsmiddelen ophaalt. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan o.a. soepen en sauzen; het mag daarom wel gebruikt worden.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
<b>Gist gebruikt voor de bereiding van:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brood</li> <li>- Taart</li> <li>- Koekjes</li> <li>- Oliebollen</li> <li>- Beschuiten</li> </ul>		<b>Producten die pure gist bevatten.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marmite</li> <li>- Vetamite gistextract pasta</li> <li>- Vitam R gistextract</li> </ul> <b>Reformartikelen die gist bevatten zoals:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biergist</li> <li>- Brooddrink</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aromat</li> <li>- Gistextract in soepen en sauzen in zakjes, blik of pot, aangezien deze een kleine hoeveelheid gistextract bevatten</li> </ul>		Maggi aroma



## Eenpansgerechten, gekoelde maaltijden, uit eten gaan

Eenpansgerechten, zoals stampotten of nasi, en gekoelde maaltijden zijn toegestaan, maar let u er tijdens het vervoer van de winkel naar huis op dat de temperatuur onder de 10° C blijft (gebruik van een koeltas 's zomers is aan te bevelen). Thuis direct in de koelkast plaatsen en consumeren voor de THT datum.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
Eenpansgerechten die <b>geen</b> producten bevatten uit de kolom "wat u niet mag eten" en <b>niet meer</b> dan de toegestane hoeveelheid uit de kolom "wat u beperkt mag eten" (zie hierboven )		– Eenpansgerechten, pizza en gekoelde maaltijden die veel (>20 gram) kaas bevatten of oude of buitenlandse kaassoorten of salami
		– Kaasfondue
		– Hamburgers, andere kip/visgerechten en maaltijdsalades die kaas bevatten

## Overig

Sportvoeding, zoals eiwitshakes, bevatten over het algemeen een hoge concentratie aan aminozuren (ook van de aminozuren tryptofaan en tyrosine). Uit tyrosine wordt tyramine gevormd en daarom worden deze shakes afgeraden.

Wat u wel mag eten	Wat u beperkt mag eten	Wat u niet mag eten
<b>Broodbeleg:</b> – Pindakaas – Jam – Hagelslag – Sandwichspread – Stroop	– Zoete en zoute drop max. 50 gram. Vanwege invloed op de bloeddruk (glycyrrhizinezuur) –	– Marmite – Vetamite gistextract pasta – Tartex
– Producten met Probiotica		– Reformartikelen zoals ginseng producten, St. Janskruid . – Zuurdesembrood – Vitaminepreparaten in dosering hoger dan ADH* – L-tryptofaan – Sportvoedingspreparaten met weipoeder/aminozuren

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noten en pinda's</li> <li>- Noodles instant in beker of zakje (met kruiden/ groente/ kip)</li> <li>- Sportrepen</li> <li>- Noga</li> <li>- Marsepein</li> <li>- Bouillon tabletten</li> <li>- Boemboe</li> <li>- Boter</li> <li>- Crème fraiche, kookroom en zure room</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampo bij droge hoest</li> <li>- Otrivin en vergelijkbare neussprays die xylometazoline bevatten</li> </ul>
--	--	--

\*) Bij een aangetoond tekort aan vitamine(s) mag uw arts of psychiater een hogere dosis voorschrijven. Ook na een maagverkleiningsoperatie of bij een resorptie stoornis mag een aanvullend vitamine preparaat worden voorgeschreven. Vitamine D suppletie kan, afhankelijk van de dosis, eenmaal per dag, week, maand, of kwartaal worden voorgeschreven.

## Algemene adviezen

Het is verstandig om de temperatuur van de koelkast regelmatig te controleren d.m.v. een koelkastthermometer. De temperatuur mag niet boven de 7° C komen (voorkeurstemperatuur ligt tussen 4° C en 7° C).

Door verse producten te kopen en deze kort en koel te bewaren en op korte termijn te verwerken, blijft het tyramine gehalte laag.

Op melkproducten in pak of fles staat een ten minste houdbaar tot datum (THT) vermeld. Het is belangrijk om deze niet te overschrijden. Na openen (ook als het voor de THT datum is) kunt u de melk(producten) nog maximaal 3 dagen gebruiken. Dit geldt ook voor koffiemelk.

Door eiwitproducten te kopen in een winkel die goed bekend staat, waar de omzet groot is, zullen de verse, eiwitrijke producten weinig tyramine bevatten.

Bevroren vlees, vis en kip moeten in de koelkast of magnetron ontdooid worden, waarna ze direct bereid moeten worden.

Eieren dienen op een koele plaats (4-12° C) bewaard te worden en voor de THT datum gebruikt te worden.

Gerechten die bereid zijn en bewaard moeten worden, moeten zo snel mogelijk worden afgekoeld en in de koelkast geplaatst.

Bereid vlees, vis, kip en soep kan 24 uur in de koelkast bewaard worden.

Vleeswaren kunnen na openen maximaal 4 dagen in de koelkast bewaard worden (let wel op THT datum).

Chocola, schaal- en schelpdieren, inktvis (calamaris) en alcohol kunnen een overgevoeligheidsreactie geven, bijvoorbeeld hoofdpijn, die niet samenhangt met het gebruik van Tracydal®. Indien u dit bij uzelf merkt, vermijd dan deze producten.

Gaat u uit eten of heeft u vakantieplannen naar een exotische bestemming, dan kunt u via Daleco Pharma contact opnemen met de afdeling diëtetiek van de Parnassia groep. Zij kunnen u uitleg en advies geven.

**Wanneer u ernstige of vreemde verschijnselen bij uzelf opmerkt (bijvoorbeeld ernstige hoofdpijn, stijve nek en/of hevige onrust) of last heeft van misselijkheid en braken, neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze verschijnselen kunnen het gevolg zijn van bloeddrukverhoging.**

Wanneer u bij een andere arts of tandarts komt, geef dan altijd aan dat u Tracydal® gebruikt.

MAO-remmers kunnen namelijk in combinatie met andere medicijnen die normaal ongevaarlijk zijn toch tot gevaarlijke reacties leiden. Neem daarom geen andere medicijnen dan uw arts u voorschrijft.

Het is verstandig om het gebruik van zelfhulpmedicatie en andere alternatieve middelen altijd te overleggen met uw arts. Hier kunnen middelen bij zijn die samen met MAO-remmers gevaarlijk zijn.

Stopt u met Tracydal® dan moet u nog 10 dagen dit voedingsadvies blijven volgen. Dit omdat de enzym-activiteit pas langzaam weer op niveau komt. Dit betekent dat het dieet tot 10 dagen na de beëindiging van Tracydal® moet worden volgehouden.

## Hoe houd ik de informatie up to date ?

Dit boekje wordt regelmatig bijgewerkt. Om te zorgen dat u altijd over de meest recente informatie beschikt, heeft Daleco Pharma de service om u bij wijzigingen hiervan op de hoogte te stellen.

Mocht u dit op prijs stellen dan verzoeken wij u onderstaande antwoordstrook in te vullen en deze in een enveloppe (zonder postzegel) op te sturen naar Daleco Pharma B.V.

Uw gegevens zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en op geen enkele wijze voor commerciële zaken worden gebruikt!

.....Antwoordstrook.....

Graag wordt ik op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Naam :.....geslacht m / v

Adres :.....

Postcode :.....

Woonplaats:.....

Emailadres:.....

Dit antwoordstrookje kan in een ongefrankeerde enveloppe gezonden worden naar:

Daleco Pharma b.v.

Antwoordnummer 13700

4157 ZX Enspijk

t.a.v. ondersteuning Tracydal®



## Bloeddruk metingen

Zoals hierboven beschreven is het zeer belangrijk om u aan het dieet te houden terwijl u Tracydal® gebruikt, omdat de stof tyramine kan ophopen in het lichaam en bloeddruk stijgingen kan veroorzaken.

Daarom is een regelmatige meting van de bloeddruk (met name) in het begin van uw behandeling belangrijk. De resultatentabel verderop in dit boekje kan u helpen om deze bloeddrukmetingen bij te houden. U kunt deze tabellen ook vinden op [www.dalecopharma.nl](http://www.dalecopharma.nl).

Noteer vanaf het begin van de behandeling 2 x daags uw bloeddruk om..... en..... uur en leg de resultaten per dag vast.

Komt u op herhaling bij uw behandelaar, neem dan dit boekje mee zodat uw behandelaar inzage krijgt in het resultaat van de behandeling.

Een plotselinge stijging van uw bloeddruk kan onder andere de volgende klachten geven:

Hoofdpijn, oorsuizen, misselijkheid en problemen met zien (vlekjes voor de ogen).

Ook kunt u lichte hartkloppingen of een bloedneus krijgen.

U dient dan de bloeddruk extra te controleren:

1. Indien deze niet of nauwelijks is verhoogd (bovendruk tot 140 en/of onderdruk tot 95) dan komen deze klachten niet door de bloeddruk. Eventueel meet u na een uur nogmaals.
2. Is de bloeddruk meer verhoogd (bovendruk tot 160 en/ of onderdruk tot 110) en u heeft geen andere klachten dan meet u na een uur opnieuw de bloeddruk.
3. Blijft de bloeddruk verhoogd of heeft u ook andere klachten : bijv. braken, pijn/druk op de borst; stijve nek, pijn tussen de schouderbladen, veel transpireren, benauwdheid, plotseling onrustig en/of sufheid, ga dan naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis.
4. Is uw de bovendruk boven de 180 en/of de onderdruk boven 100 dan is sprake van een hypertensieve crisis en is onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk om de bloeddruk te laten zakken en moet u direct naar de SEH van een ziekenhuis. U mag niet zelf rijden in dit geval. Laat u direct rijden door iemand anders of waarschuw de ambulance (via 112).

Op de SEH kunt u een infuus met fentolamine krijgen.

Als u geen andere klachten heeft en geen astma en de onderdruk is tussen 120 en 140 dan krijgt u een capsule labetolol 200 mg. Dit wordt eventueel herhaald na 1 uur indien de bloeddruk nog niet voldoende is gedaald. Ook kunt u nifedipine (Adalat) krijgen.

**Bij een ongeluk of een geplande operatie/ingreep is het voor ambulance, ziekenhuis en/of arts erg belangrijk om te weten dat u Tracydal® gebruikt. Dit geldt ook voor medicatie die door andere (tand)artsen wordt voorgeschreven.**

Draag daarom altijd de meegeleverde patiëntenpas bij u. U kunt op deze pas zelf uw gegevens en de gegevens van uw behandelaar invullen. Zo kan het ziekenhuis altijd zien dat u Tracydal® gebruikt en indien nodig uw behandelaar contacteren voor meer informatie.

Naast het bijhouden van de bloeddruk is het van belang dat u eventuele bijwerkingen, die kunnen optreden, bijhoudt. Ook dat kunt u met behulp van de tabellen in dit boekje doen. Bespreek de eventuele bijwerkingen met uw behandelend arts. Hij/zij kan beoordelen of deze op zichzelf staan of wellicht veroorzaakt worden door andere medicijnen welke u wellicht gebruikt.

Aanvullende informatie betreffende Tracydal® (tranylcypromine) is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op [www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl). De risico minimalisatie materialen zijn ook beschikbaar op [www.dalecopharma.nl](http://www.dalecopharma.nl). Dit boekje en de patiëntenpas kunnen gratis worden aangevraagd via Daleco Pharma BV: [pvd@dada.nl](mailto:pvd@dada.nl), Tel 024 3030804.

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product; Daleco Pharma BV ([pvd@dada.nl](mailto:pvd@dada.nl), Tel 024 3030804).



