

Locacorten® Vioform® oordruppels 7,5 ml

Tweemaal daags
2 - 3 druppels
max. 10 dagen



Diverse oordruppels beschikbaar



Dosering van oordruppel Locacorten® Vioform®

Tweemaal daags
2 - 3 druppels
max. 10 dagen



Indicatie

Seborroïsch eczeem van de uitwendige gehoorgang, waarbij secundaire infectie is opgetreden, met voor clioquinol gevoelige micro-organismen.



Samenstelling

Flumethasonpivalaat 0,2 mg/g

Clioquinol 10 mg/g

Eigenschappen

Flumethasonpivalaat is een matig/sterk
werkend corticosteroid.

Vermindert jeuk en zwelling.

Eigenschappen

Clioquinol, naast antibacteriële werking op gram+ bacteriën zoals Stafylococcus aureus, tevens werkzaam tegen schimmels zoals Candida, Microsporum en Trichophyton.

Gebruiksaanwijzing

- Gebruik het geneesmiddel volgens het voorschrift van uw arts of apotheker.
- Voordat u de oordruppels aanbrengt, moet de gehoorgang zorgvuldig schoongemaakt en gedroogd worden. Tweemaal daags 2-3 druppels in de gehoorgang druppelen door licht in het flesje te knijpen. Het hoofd daarbij opzij houden met het te behandelen oor naar boven. Na het indruppelen nog 1-2 minuten zo blijven zitten

Reinigen gehoorgang

- Eventueel kunt u een gaasje of tampon met de oplossing nat maken en in de gehoorgang inbrengen. De tampon of het gaasje vochtig houden met de oordruppels. Tenminste één maal per 24 uur vervangen.
- De oordruppels mogen voor het inbrengen verwarmd worden tot lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door het flesje in de handen te houden. Verwarming boven de lichaamstemperatuur dient vermeden te worden. Let erop dat de druppelaar niet verontreinigd wordt door bijv. oorsmeer, vuile vingers etc

Praktische uitvoering

- Opwarmen in de hand, z.n. schudden,
- Reinigen gehoorgang met tissue-puntje,
- Druppelen met hoofd in liggende houding,
- Oorschelp naar achter-boven trekken,
- Enige minuten blijven liggen,
- Zo nodig watje in het oor.

Contra-Indicatie

- Geperforeerde trommelvliezen,
- Overgevoeligheis voor componenten van het vehiculum, jodium of corticosteroiden,
- Kinderen jonger 2 jaar,
- Gebruik in het oog.

Waarschuwing

- Controle van trommelvlies voorafgaande van behandeling. Geen toepassing bij risico op perforatie.
- Indien binnen 7 dagen geen verbetering, behandeling staken.
- Voorkom contact met ogen of oogleden.
- Contact van Locacorten[®] Vioform[®] met haar, textiel (beddegoed, kleding) kan verkleuring veroorzaken.

Verpakking

- Flacon à 7,5 ml,
- Hulpstof: Polyethyleenglycol,
- Houdbaarheidstermijn 3 jaar,
- Bewaren bij een temperatuur tussen de 15-25 °C,
- RVG 05628,
- Registratiehouder: Amdipharm Ltd.,
- Distributeur: Daleco Pharma b.v.

Literatuur

- Antimicrobial activity of topical skin Pharmaceuticals. Acta Derm Venereol 2010;90:239-245. Mikael Alsterholm et al,
- Allergy due to topical medications in chronic otitis externa and chronic otitis media. Clin. Otolaryngol.1995,20, 326-328.C.van Ginkel et al,
- Medicament contact dermatitis in patients with chronic inflammatory ear disease. Journal of Society of Medicine Volume 75 January 1982 R.C. Holmes et al St. Thomas Hospital London.